

Aviso de Salud

Sarampión

El **Departamento de Salud Pública del Condado de Montgomery** ha reportado **cuatro casos de sarampión en residentes no vacunados** del Condado de Montgomery. Los casos corresponden a cuatro **miembros de una misma familia** que estuvieron expuestos a un caso confirmado de sarampión en un **viajero procedente de otro estado**.

En este momento **no se han confirmado casos en el Condado de Fort Bend**; sin embargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Fort Bend recomiendan a los proveedores de atención médica **mantenerse atentos ante posibles casos de sarampión**, informar de inmediato cualquier caso sospechoso al departamento de salud local y asegurarse de que los pacientes pediátricos y adultos **estén al día con su vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR)**.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Fort Bend continuarán monitoreando la situación.




Aviso de Salud Pública

Recomendaciones para **los Profesionales de la Salud**

Los proveedores de atención médica deben considerar el sarampión en pacientes que presenten los **siguientes signos y síntomas**, especialmente aquellos que hayan realizado **viajes nacionales o internacionales** o que **hayan tenido contacto con casos confirmados o sospechosos de sarampión**:

- Fiebre ≥ 101 °F (38.3 °C) **Y**
- Erupción maculopapular generalizada que dure ≥ 3 días **Y**
 - La erupción generalmente comienza en la línea del cabello o el cuero cabelludo y progresa hacia abajo por el cuerpo.
- Tos, secreción nasal o conjuntivitis **O** manchas de Koplik (pequeños puntos de color blanco azulado sobre un fondo rojo-rosado que aparecen en la mucosa bucal y labial, generalmente frente a los molares).



Aviso de Salud Pública

Recomendaciones para los Profesionales de la Salud

Implemente de inmediato precauciones de aislamiento para cualquier paciente con sospecha de sarampión y siga los protocolos de control de infecciones de su centro (por ejemplo, precauciones para enfermedades transmitidas por el aire).

Informe de manera rápida los casos sospechosos a su departamento de salud local para apoyar una respuesta de salud pública rápida y el rastreo de contactos. Si es posible, realice el informe mientras el paciente aún esté presente para facilitar las pruebas y la investigación de salud pública, incluido el seguimiento de posibles exposiciones.

Houston Area Health Departments

Harris County Public Health
Telephone: (832) 927-7575
Fax: (713) 439-6306
After Hours: (713) 755-5050
<http://publichealth.harriscountytexas.gov/>

Houston Health Department
Telephone: (832) 393-5080 (24 hr #)
Fax: (832) 393-5232
www.houstontexas.gov/health/index.html

Brazoria County Health Department
Telephone: (979) 864-1166
Fax: (979) 864-3694
After Hours: (979) 583-1979
<https://www.brazoriacountytexas.gov/departments/health-department/infectious-diseases>

Chambers County Health Department
Telephone: (409) 267-2731
Fax: (409) 267-4276
After Hours: (409) 267-9862
www.ccph.org

Fort Bend County Health and Human Services
Telephone: (346) 481-6500
Fax: (832) 471-1817
After Hours: (832)-612-7761
<https://www.fbchhs.org/>

Galveston County Health District
Telephone: (409) 938-2208
Fax: (409) 938-2399
After Hours: (409) 220-1523
www.gchd.org

Montgomery County Public Health
Department
Telephone: (936) 523-5026
Fax: (936) 539-9272
After Hours: (888) 825-9754
<https://mcphd-tx.org>

Texas Department of State Health Services
Health Service Region 6/5 South
Telephone: (713) 767-3000
Fax: (713) 767-3006
After Hours: (800) 270-3128
www.dshs.state.tx.us/region6-5/default.shtm

Copyright © Harris County Public Health, All rights reserved.

Aviso de Salud Pública

Recomendaciones para los Padres

- El sarampión se puede prevenir con **la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR)**.
- La vacunación de rutina contra el sarampión, las paperas y la rubéola consiste en **una serie de 2 dosis** administradas a los **12-15 meses** de edad y **a los 4-6 años de edad**.
- En el caso de niños y adolescentes que no estén vacunados, las 2 dosis pueden administrarse con **al menos 4 semanas de diferencia**.
- **Dos dosis de la vacuna MMR brindan una mejor protección** (97%) contra el sarampión que una sola dosis (93%).
- Hable con el **proveedor de atención médica** de su hijo(a) sobre situaciones especiales, como viajes internacionales o brotes locales de sarampión.

Source: <https://www.cdc.gov/measles/hcp/clinical-overview/stay-alert-for-measles-cases.html>

Aviso de Salud Pública

Recomendaciones para **Viajeros** **Nacionales e Internacionales**

- Antes de su próximo viaje, **consulte su destino y el Aviso de Salud para Viajeros sobre el Sarampión a Nivel Mundial de los CDC** para obtener más recomendaciones de salud durante los viajes, incluyendo información sobre los lugares donde se han reportado brotes de sarampión.
- Consulte con el proveedor de atención médica de su hijo(a) **para asegurarse de que sus vacunas MMR estén al día al menos 2 semanas antes del viaje.**
- **Los bebés de 6 a 11 meses** de edad deben tener documentada una dosis de la vacuna MMR, **y los niños de 12 meses de edad o más** deben tener documentadas dos dosis de la vacuna MMR antes de viajar al extranjero.



Aviso de Salud Pública


Recomendaciones para Viajeros Nacionales e Internacionales

- Después de **un viaje internacional** o de **un viaje nacional** a una **región con un brote de sarampión**, debe estar atento(a) a los signos y síntomas del sarampión durante **3 semanas** después de su regreso.
- Si usted o su hijo(a) se enferman con una erupción y fiebre alta, **llame a su proveedor de atención médica**. Infórmele que usted viajó al extranjero o a una región donde hay un brote de sarampión, y si usted o su hijo(a) han recibido la vacuna MMR.

Los síntomas incluyen:




Fiebre



Ojos rosados



Erupción cutánea



Secreción nasal



Tos